

# あぐり情報

営農生活課

中村好仁



## 農薬の紹介

今回はネギへの適用が新たに登録されたシグナムWDG、ネギのべと病やその他作物のべと病、疫病に有効なザンプロDMフロアブルを紹介していきます。

シグナムWDGはボスカリドとピラクロストロドンを効率よく混合した野菜用殺菌剤です。作用性の異なる成分を混合することで幅広い病害に高い防除効果を示します。また、両成分ともに葉内での浸透性が高く優れた効果持続性と耐雨性を有する薬剤です。訪花昆虫や天敵などの有用昆虫への影響も少ないです。

主な適用病害はキャベツの菌核病や、白菜の白斑病、レタスの灰色カビ病などです。またネギへの適用が登録されネギのべと病、さび病、黒斑病にも有効です。



## ■シグナムWDGの主な適用病害

価格：1,111円  
(税込み)

| 作物名    | 適用病害虫名               | 希釈倍率       | 使用液量              | 使用時期     | 本剤の使用回数 |
|--------|----------------------|------------|-------------------|----------|---------|
| ネギ     | べと病、黒斑病、さび病          | 1500倍      | 100~300L<br>/ 10a | 収穫7日前まで  | 3回以内    |
| キャベツ   | 菌核病、株腐病              | 1500倍      | 100~300L<br>/ 10a | 収穫7日前まで  | 2回以内    |
| 白菜     | 白斑病、黒斑病、べと病、白さび病     | 1500~2000倍 | 100~300L<br>/ 10a | 収穫7日前まで  | 3回以内    |
| レタス    | 灰色かび病、菌核病、すそ枯病       | 1500倍      | 100~300L<br>/ 10a | 収穫7日前まで  | 2回以内    |
| 非結球レタス | 灰色かび病、菌核病、すそ枯病       | 1500倍      | 100~300L<br>/ 10a | 収穫14日前まで | 2回以内    |
| なす     | 灰色かび病、菌核病、うどんこ病      | 1500倍      | 100~300L<br>/ 10a | 収穫前日まで   | 3回以内    |
| たまねぎ   | 灰色かび病、灰色腐敗病、べと病、小菌核病 | 1500倍      | 100~300L<br>/ 10a | 収穫7日前まで  | 3回以内    |

ザンプロDMフロアブルは2種類の有効成分を有する殺菌剤で、ばれいしよの疫病やネギのべと病を防除します。一部の作物では収穫前日まで使えます。

本剤は異なる作用機作を持つ2成分を混合することで、疫病、べと病の生活環のほぼすべてのステージを強く阻害します。本剤は葉面ワックス層に対して高い親和性を有することで、高い耐雨性および残効性を示します。また、浸透性を有し、治療的効果も有します。イニシウムおよびジメトモルフは、卵菌類に属する疫病およびべと病に対して特異的に高い抗菌活性を示します。

主な適用病害はネギのべと病やばれいしよの疫病、たまねぎのべと病などです。



## ■ ザンプロDMフロアブルの主な適用病害

価格：2,662円  
(税込み)

| 作物名          | 適用病害虫名 | 希釈倍率       | 使用液量             | 使用時期     | 本剤の使用回数 | ジメトモルフを含む農薬の総使用回数 |
|--------------|--------|------------|------------------|----------|---------|-------------------|
| ネギ           | べと病    | 1500～2000倍 | 100～300L<br>／10a | 収穫14日前まで | 3回以内    | 3回以内              |
| ばれいしよ        | 疫病     | 1000～1500倍 | 100～300L<br>／10a | 収穫前日まで   | 3回以内    | 3回以内              |
| トマト<br>ミニトマト | 疫病     | 1500倍      | 100～300L<br>／10a | 収穫前日まで   | 3回以内    | 3回以内              |
| きゅうり         | べと病    | 1500～2000倍 | 100～300L<br>／10a | 収穫前日まで   | 3回以内    | 3回以内              |
| たまねぎ         | べと病    | 1500～2000倍 | 100～300L<br>／10a | 収穫7日前まで  | 3回以内    | 3回以内              |
| レタス<br>白菜    | べと病    | 1500～2000倍 | 100～300L<br>／10a | 収穫3日前まで  | 3回以内    | 3回以内              |

