

# あぐり情報

営農生活課

中村 好仁



## 農薬の紹介

今回は新薬のカナメフロアブルとヨーバルフロアブルについて紹介します。

カナメフロアブルは殺菌剤で、幅広い病害に対し安定した防除効果を示します。そして優れた予防効果を有し、治療効果も示します。特に担子菌（白絹病、さび病等）、なし黒星病などに対し高い効果を示します。さらに浸透性、浸透移行性、耐雨性を有する殺菌剤です。アフエットフロアブルと同じSDHI系ですが、インピルフルキサムという新しい成分なので使用回数を別カウントにできます。しかし、同系統の薬剤を連用すると抵抗性がついてしまうので注意しましょう。

ヨーバルフロアブルは殺虫剤でアオムシやヨトウムシなどのチョウ目害虫やハモグリバエ類、アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類、コガネムシ類などの幅広い害虫に効果があります。ジアミド系薬剤という事もあり、残効性が高く、長期間作物を守ります。さらに多くの作物で収穫前日までの散布が出来ます。そして、作物の種類によっては育苗期の灌水でも使用できます。

注意点としてベネビアやベリマクなどの同じジアミド系薬剤の連用は抵抗性が付きやすくなるのでローテーション防除を行う際は別系統の薬剤を組み合わせ使用しましょう。また、付着性の高い成分が入った農薬ではないので、散布使用の場合は、展着剤が必要となります。そして一部の天敵昆虫、訪花昆虫にも影響が出てしまうので注意しましょう。



ヨーバルフロアブル100ml  
価格：3,014円(税込)  
2021年4月現在

### ■ヨーバルフロアブルの主な適用作物

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量 (ℓ/10a)	使用時期	本剤の使用回数
ねぎ	シロイチモジヨトウ、ネギコガ、ハモグリバエ類、アザミウマ類	2500～5000倍	100～300	収穫 3日前まで	3回以内
	クロバネキノコバエ類	2500倍			
なし	ハマキムシ類、ヒメボクトウシンクイムシ類	5000～10000倍	200～700	収穫 前日まで	2回以内
えだまめ	マメシンクイガ、ウコンノメイガ、ハスモンヨトウ	5000倍	100～300	収穫 前日まで	3回以内
キャベツ	コナガ、アオムシ、ウワバ類、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、アブラムシ類、アザミウマ類、シロイチモジヨトウ	2500～5000倍	100～300	収穫 前日まで	3回以内

※農薬の使用にあたってはラベルをよく読み使用基準（適用作物、希釈倍数、使用時期、10a 当たりの使用量、総使用回数）を厳守しましょう。



カナメフロアブル125ml  
価格：3,641円(税込)  
2021年4月現在

### ■カナメフロアブルの主な適用作物

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量 (ℓ/10a)	使用時期	本剤の使用回数
ねぎ	さび病 白絹病	4000～8000倍	100～300	収穫 前日まで	4回以内
	黒腐菌核病 黒斑病	4000倍			
たまねぎ	灰色かび病 小菌核病	4000倍	100～300	収穫 前日まで	4回以内
	灰色腐敗病	4000～8000倍			
なし	黒星病 赤星病	4000～8000倍	200～700	収穫 前日まで	3回以内
	黒斑病 輪紋病	4000倍			
豆類（種実、 但し、落花生を除く）	菌核病 灰色かび病	4000倍	100～300	収穫 前日まで	4回以内
かんきつ	灰色かび病	4000～8000倍	200～700	収穫 前日まで	3回以内
	そうか病	4000倍			