

あぐり情報

営農生活課

中村 好仁



農薬の紹介

今回は新薬のブフロレアSC、そして今年の3月に適用作物の追加があったファインセーブフロアブルについて紹介します。

ブフロレアSCは殺虫剤でチョウ目、ハムシの専門剤です。

主な特徴として、まず新規作用機構を有する殺虫剤です。チョウ目、ハムシ類の専門剤であり、同時防除が可能です。そして、既存剤に抵抗性を獲得した抵抗性害虫にも効果を示します。

数時間で作用を発現し、速やかな殺虫効果を示します。効果持続性に優れ、葉面上で約3週間の効果を示します。耐雨性にも優れ突如の雨でも効果の持続性が変わらな

ファインセーブフロアブルは殺虫剤で主にアザミウマ類やタバココナジラミ類などに有効です。今年の3月に適用作物の追加がありました。主な追加の作物は、ミニトマト、わけぎ、にら、ブロッコリー、カリフラワー、アスパラガスなどです。

ファインセーブフロアブルの特徴は、アザミウマ類に特効的で、サビダニ類、タバココナジラミ類、小型チョウ目などの様々な害虫に高い効果があります。新規作用機構をもつ農薬のため、既存剤に感受性の低下した害虫にも効果が期待できます。ミツバチ、マルハナバチ、カブリダニ類などの天敵や有用昆虫に対して影響の小さい剤です。

注意点として、浸透移行性を持たない剤のため、かけむらが出ないような丁寧な散布が必要です。特に果菜類では葉裏までかかるような散布をしましょう。

※ファインセーブフロアブルは医薬用外劇物です。ご購入の際は印鑑が必要となります。

ブフロレアSC

価格：250ml 5,192円
500ml 10,131円
(税込み) 2021年8月現在



ブフロレアSCの主な適用作物

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数
ねぎ	シロイチモジヨトウ、ネギコガ	2000～4000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内
だいこん	アオムシ、カブラハバチ、キスジノミハムシ、コナガ、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ				
かぶ	コナガ				
キャベツ	アオムシ、ウワバ類、オオタバコガ、コナガ、ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ				
はくさい	アオムシ、オオタバコガ、コナガ、ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ				
ブロッコリー	アオムシ、オオタバコガ、コナガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ				
カリフラワー	アオムシ、コナガ				
レタス 非結球レタス	ウワバ類、オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ				
えだまめ	オオタバコガ、ハスモンヨトウ				

ファインセーブフロアブル
価格：500ml 9,141円
(税込み) 2021年8月現在



ファインセーブフロアブルの主な適用作物

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数
ミニトマト	アザミウマ類	1000～2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内
	トマトサビダニ、タバココナジラミ類	1000倍			
わけぎ	アザミウマ類、ネギハモグリバエ	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内
にら	アザミウマ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内
ブロッコリー	アオムシ、アザミウマ類	1000倍	100～300ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内
	コナガ	1000～2000倍			
カリフラワー	アオムシ、アザミウマ類	1000倍	100～300ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内
	コナガ	1000～2000倍			
アスパラガス	アザミウマ類	2000倍	100～800ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内

※農薬の使用にあたってはラベルをよく読み使用基準(適用作物、希釈倍数、使用時期、10a当たりの使用量、総使用回数)を厳守しましょう。