

# あぐり情報

営農生活課  
中村 好仁



## 農薬の紹介

今回は、ネギの適用病害虫に新たな追加があった、マッチ乳剤とパレード20フロアブルについて紹介します。

パレード20フロアブルの特徴は有効成分「ピラジフルミド」を配合した野菜用SDHI殺菌剤であり、優れた防除効果と高い安全性を示します。

さらに浸達性、移行性があり、治療、予防、耐雨、残効性に優れます。

ネギの適用に「白絹病」が新たに追加されました。ネギ以外にも様々な作物の菌核病やうどんこ病、灰色かび病などの病害に高い効果を示します。

マッチ乳剤の特徴は害虫の脱皮を阻害して殺虫効果があります。効果の発現はやや遅いですが、幼虫主体の発生初期に散布する事で、長期間密度を抑制します。そして、蜂と天敵への影響が少なく、IPM適合性の高い農薬です。

また、一部の害虫には殺卵効果も示します。処理部位に薬剤が滞留して長い保護効果を示します。但し、作物体内の移行性がなく新しく成長してくる部位での効果はないので、成長が旺盛な時期には2週間間隔での連続散布が必要です。

ネギの適用に「ネギアザミウマ」が新たに追加されました。ネギ以外にもトマト、キャベツなどの様々な作物のチョウ目害虫、サビダニなどに効果を示します。

### ■ マッチ乳剤の主な適用作物



マッチ乳剤 500 ml  
5,192円 2022年9月現在

作物名	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	
ネギ	ネギアザミウマ、シロイチモジヨトウ	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	
トマト	ハモグリバエ類	1000倍		収穫前日まで	4回以内	
	アザミウマ類	1000～2000倍				
	コナジラミ類、トマトサビダニ	2000倍				
	オオタバコガ	2000～3000倍				
	ハスモンヨトウ	3000倍				
キャベツ	ヨトウムシ、アオムシ、コナガ	2000～3000倍		収穫7日前まで	3回以内	
	ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ	3000倍				
はくさい	コナガ、アオムシ	2000～3000倍				

\*農薬の使用にあたってはラベルをよく読み使用基準(適用作物、希釈倍数、使用時期、10a当たりの使用量、総使用回数)を厳守しましょう。

### ■ パレード20フロアブルの主な適用作物



パレード20フロアブル 250 ml  
6,094円(税込み) 2022年9月現在

作物名	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数			
ネギ	白絹病 さび病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内			
	黒斑病、葉枯病 小菌核腐敗病	2000～4000倍						
トマト	すすかび病	2000倍						
	うどんこ病 灰色かび病 菌核病、葉かび病	2000～4000倍						
キャベツ	株腐病、菌核病、根朽病	2000～4000倍						
はくさい	菌核病、黒斑病、白斑病	2000～4000倍						