



あぐり情報 Aguri Information

営農生活課
中村 好仁

農薬の紹介

農薬の紹介

今回はカナメフロアブルと、ネコナカットフロアブルについて紹介します。

カナメフロアブルは殺菌剤で、幅広い病害に対し安定した防除効果を示します。そして、優れた予防効果を有します。特に担子菌（白絹病、さび病等）、なし黒星病などに対し高い効果を示します。さらに浸透性、浸透移行性を有する殺菌剤です。また、多くの作物で収穫前日まで使用可能です。

ブロッコリー、にんじん、トマト、ミニトマト、いちごなどの作物に適用拡大がありました。

※カナメフロアブルは医薬用外劇物です。ご購入の際は印鑑が必要となります。

ネコナカットフロアブルは新規系統のネダニ、ケナガコナダニ剤です。

ネダニ類、ケナガコナダニ類の脱皮を阻害し、幼若虫に優れた効果を発揮します。収穫前日数が短く、使い勝手の良い薬剤です。作物への安全性が高く、安心して使えます。

適用作物は、にらとほうれんそうです。

にらの防除では、収穫前日数が短いため、生育が旺盛な時期にも安心して使用できます。異なる系統の薬剤とのローテーション防除を行うことがポイントです。

ほうれんそうの防除では、薬液が圃場の隅々まで十分かかるよう、200ℓ/300ℓ/10aの散布がおすすめです。また、ケナガコナダニ類が表層土へ移動する本葉2葉期での散布がポイントです。

■ネコナカットフロアブルの適用作物

ネコナカットフロアブル 500ml
価格：2,365 円(税込)
2024 年 1 月現在



作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数
にら	ネダニ類	1000倍	3ℓ/m ²	収穫 7日前まで	1回
ほうれんそう	ケナガコナダニ類	1000倍	100~ 300ℓ/10a	収穫 3日前まで	2回以内

※ 農薬の使用にあたってはラベルをよく読み使用基準
(適用作物、希釈倍数、使用時期、10a当たりの
使用量、総使用回数)を厳守しましょう。

■カナメフロアブルの主な適用作物

カナメフロアブル 125ml
価格：3,817 円(税込)
2024 年 1 月現在



作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量 (ℓ/10a)	使用時期	本剤の使用回数
ブロッコリー	菌核病 黒すす病	4000倍	100~300	収穫 前日まで	3回以内
にんじん	斑点病				
トマト	うどんこ病 灰色かび病 菌核病 葉かび病 すすかび病				
ミニトマト	うどんこ病 灰色かび病				
いちご	うどんこ病 灰色かび病	4000~ 8000倍	200~700		4回以内
ねぎ	黒腐菌核病 黒斑病 葉枯病 さび病 白絹病				
なし	黒斑病 輪紋病	4000倍	200~700		3回以内
	黒星病 赤星病	4000~ 8000倍			